

姓名：	班別：	班號：
-----	-----	-----

細閱以下剪報，然後回答問題。

本港再增麻疹個案 機場醫院員工高危 **2019/04/11**

繼菲律賓、泰國、日本、美國等多個國家出現麻疹疫情後，近月香港亦爆發麻疹。根據衛生防護中心公布的最新消息，本年截止 4 月 10 日，累計共 65 宗確診個案，部分屬外地輸入個案。中心已就確診個案展開流行病學調查，進行接觸者追蹤的工作，以盡早識別患者。

麻疹是一種具有高傳染性的疾病，其病毒可經由空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，潛伏期一般為 7 至 21 日。麻疹初期的病徵包括咳嗽、流鼻水、發燒等，其後臉部和全身會出現紅疹，嚴重的可能會影響呼吸系統和腦部，甚至死亡。現時以接種疫苗為預防麻疹的最有效方法。

本港今年的確診個案中，29 宗的感染者屬機場或航空公司的職員。世界衛生組織回覆本港媒體查詢麻疹疫情時指出，旅遊大大提升了麻疹在國際間傳播的風險，在機場工作的人員及航空公司職員，經常接觸到來自麻疹爆發地區的旅客，有較高機會受到感染。鑑於機場成為麻疹爆發的「重災區」，衛生防護中心早前在機場設立疫苗接種站，替所有機場員工注射麻疹疫苗，但由於疫苗供應緊張，員工人數眾多，其後更改安排，只為合資格的高風險機場員工注射麻疹疫苗，並提供麻疹血清測試服務，以識別需要接種疫苗的人士。

隨着出現醫護人員受感染的個案，醫管局及衛生防護中心經過衡量員工感染風險及疫苗供應的情況，再宣布會為醫院高風險病房的工作人員、急症室所有醫護人員及普通科門診分流站醫護人員注射疫苗。有關部門指出由於麻疹初期病徵不明顯，以上醫護人員有可能透過接觸潛伏期內的麻疹病人而受感染，為減低他們受感染及再傳染給醫院內病人的風險，決定先為他們注射疫苗。

醫管局表示九成五以上的香港市民已接種兩針麻疹疫苗，社區有高度免疫力，呼籲市民無須恐慌，日常要注意個人及環境衛生，若懷疑受感染，應避免接觸其他人及盡早求診。此外，局方亦發出通知，提醒醫護人員要加強警覺性，若發現病人出現麻疹徵狀，須即時通報衛生防護中心，並且將病人隔離治療。



衛生防護中心網站內設有專頁，介紹麻疹的資訊及預防方法等。
